

# CATÁLOGO DE PRODUTOS

## LINHA ABERTA



# Anestésicos



## Anestt

**Indicação:** Cães e Gatos

**Anestt** é um anestésico local injetável à base de Cloridrato de Lidocaína 2% e Bitartarato de Epinefrina. A associação com a Epinefrina permite o **aumento do tempo anestésico** por causar vasoconstrição local.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:

Lidocaína (Cloridrato) .....2,060 g  
Bitartarato de Epinefrina .....1,001 mg  
Veículo aquoso estéril p.s.p. ....100 mL

**Posologia:** SC – Animais de pequeno porte: de 1 a 3 mL.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 50 mL.



## Apromazin injetável

**Indicação:** Cães

**Apromazin Injetável** é um pré-anestésico à base de Maleato de Acepromazina a 0,2%. Promove tranquilização e sedação dos animais facilitando a manipulação e contenção, diminui o risco de excitação e promove potencialização de agentes barbitúricos.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:

Maleato de Acepromazina .....200,0 mg  
Veículo estéril q.s.p. ....100,0 mL

**Posologia:** IM e SC– 0,30 mg/kg.  
IV – 0,20 mg/kg.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 20 mL.



# Anestésicos



## Apromazin gotas

**Indicação:** Cães e Gatos

**Apromazin** é um neuroléptico e tranquilizante oral em gotas à base de Maleato de Acepromazina 1%. Por oferecer um efeito sedativo e relaxante muscular, é indicado para a manipulação e contenção dos animais durante a realização de exames e procedimentos clínicos, permitindo que o animal fique menos reativo aos estímulos do ambiente. Apromazin também é indicado para o transporte terrestre de cães e gatos, oferecendo tranquilização, sonolência e atividade anti-emética.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:  
Maleato de Acepromazina .....1,0 mg  
Veículo aquoso q.s.p. ....100,0 mL

**Posologia:** 1 a 3 gotas/kg por via oral.

**Apresentação:** Frasco de 10 mL e 30 mL.



# Anestésicos



## Isoflurano Syntec

**Indicação:** Cães e Gatos

**Isoflurano Syntec** é o único anestésico inalatório disponível no mercado brasileiro com indicação para uso veterinário. É um agente anestésico líquido para o uso em anestesia geral inalatória por meio de vaporização. Indicado na indução e manutenção da anestesia geral em cães, gatos e equinos.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:  
Isoflurano .....100 mL

**Posologia:** Nos cães a CAM (concentração alveolar mínima) é de aproximadamente 1,2% e a de gatos é de 1,2%.  
**Indução:** Em cães e gatos é possível efetuar a indução por máscara facial utilizando Isoflurano de 5%, com ou sem pré-medicação. **Manutenção:** A Anestesia pode ser mantida utilizando o Isoflurano em concentrações de 1,5% a 2,5%.

**Apresentação:** Frascos de 100 mL.

LANÇAMENTO



## Cetamin

**Indicação:** Cães e Gatos

**Cetamin** é um anestésico geral dissociativo, à base de Cloridrato de Cetamina. Possui rápido início de ação, induzindo amnésia e catalepsia. Quando associado a um agonista alfa-2 adrenérgico, é indicado para procedimentos clínicos e cirurgias de curta duração da cavidade abdominal.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:  
Cetamina (Cloridrato) .....10,0 g  
Veículo estéril q.s.p. ....100,0 mL

**Posologia:** Para cães recomenda-se a associação anestésica conforme posologia abaixo:  
Cães: IM – 2,2 mg de Xilazina/kg + 11,0 mg de Cetamina/kg.  
Cães: IV – 1,0 mg de Xilazina/kg + 10,0 mg de Cetamina/kg.  
Gatos: IM – 10,0 a 25,0 mg/kg ou IV – 5,0 a 10,0 mg/kg.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 10 mL e 50 mL.



## Xilazin®

**Indicação:** Cães e Gatos

**Xilazin** é um sedativo e analgésico à base de Cloridrato de Xilazina 2%. Por ser considerado um agonista alfa-2 adrenérgico, possui ação rápida oferecendo acentuado miorelaxamento a nível central, o que leva o animal a um estado de sonolência. Indicado em grande escala para contenção e manipulação de cães e gatos e, quando associado a outros agentes, pode ser utilizado para procedimentos cirúrgicos.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:  
Xilazina (Cloridrato) .....2 g  
Veículo q.s.p. ....100 mL

**Posologia:** IM ou IV – 1 a 4 mg/kg.

**Apresentação:** Frasco-ampola com 10 mL e 50 mL.



# Anti-inflamatório



## Farmadex Injetável

**Indicação:** Cães e Gatos

**Farmadex Injetável** é um anti-inflamatório esteroidal, indicado para todos os casos nos quais a inflamação mostra-se como sintoma agravante, indicado principalmente para o combate às inflamações que envolvem as articulações como artrites, bursites, sinusites e tendinites. Indicado ainda no combate aos edemas por ferimentos, parto cirurgia, etc, no combate à cetose bovina, como adjuvante no tratamento das mastites, metrites, febre vitular, doenças alérgicas, reumáticas, dermatológicas, pneumonias graves e outras doenças sensíveis aos corticoides.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:  
Dexametasona (fosfato de sódio) .....200 mg  
Veículo ..... q.s.p  
.....100 mL

**Posologia:** USO PARENTERAL  
Cães: 0,5 - 2 mg de Dexametasona.  
Gatos: 0,25 - 0,5 mg de Dexametasona.  
USO INTRA ARTICULAR  
Pequenos Animais: 0,25 - 5 mg.

**Apresentação:** Frasco ampola com 10 mL.



# Pomada Cicatrizante



## Cikadol®

**Indicação:** Cães e Gatos

**Cikadol** é uma pomada formulada à base de Benzilpenicilina Benzatina, Benzilpenicilina Procaína, Diidroestreptomicina, Óleo de Citronela e Ureia. A associação dos seus ativos amplia o espectro bacteriano, suprimindo o crescimento de microrganismos Gram-positivos e Gram-negativos, além de oferecer efeitos repelente e cicatrizante, o que estimula a repitelização, devolvendo a integridade da pele.

**Fórmula:** Cada 50 g do produto contém:  
Benzilpenicilina Benzatina .....1.250.000 UI  
Benzilpenicilina Procaína .....1,250.000 UI  
Diidroestreptomicina (sulfato) .....1,25 g  
Óleo de Citronela .....0,2 g  
Ureia .....2,5 g  
Excipiente q.s.p. ....50 g

**Posologia:** Aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área lesionada 1 ou 2 vezes ao dia, até completa cicatrização.

**Apresentação:** Bisnaga com 50 g.





## Micodine®

**Indicação:** Cães e Gatos

**Micodine** é um shampoo terapêutico que associa a ação fungicida do Cetoconazol 2% com as ações antimicrobianas e antissépticas do Clorexidine 0,5%. É indicado para a prevenção e tratamento de diversas afecções de pele causadas por fungos e bactérias em cães e gatos.

**Fórmula:** Cada 100 mL contém:

Cetoconazol .....2,0 g  
Clorexidine .....0,5 g  
Veículo q.s.p. ....100 mL

**Modo de uso:** Molhar o corpo do animal e aplicar quantidade suficiente para formar espuma. Espalhar e massagear suavemente. Deixar agir por 3 a 5 minutos e enxaguar. Repetir a aplicação se necessário. A frequência entre as aplicações e o tempo de tratamento variam de acordo com o critério do médico-veterinário.

**Apresentação:** 5 L.



## Anestésicos

**AnestSC:** 1,0 a 3,0 mL.  
Para Cães e Gatos

**Apromazin IM e IV:** 0,05 a 0,2 mg/kg.  
Injetável Para Cães

**Apromazin VO:** 1 a 3 mg/kg ou 2 a 6 gotas/kg.  
Para Cães e Gatos

**Cetamin Cães** – Associado com Xilazin  
**IM:** 11,0 mg/kg de Cetamin + 2,2 mg/kg de Xilazin  
**IV:** 10,0 mg/kg de Cetamin + 1,0 mg/kg de Xilazin  
**Gatos** – Sem associações  
**IM:** 10,0 a 25 mg/kg  
**IV:** 5,0 a 10,0 mg/kg  
Para Cães e Gatos

**Isoflurano Cães:** A CAM (Concentração alveolar mínima) do isoflurano no cão é Syntec aproximadamente de 1,5 %.

**Indução:** É possível efetuar a indução por máscara facial utilizando isoflurano de 5 %, com ou sem pré-medicação. Manutenção: A anestesia pode ser mantida utilizando o isoflurano em concentrações de 1,5 % a 2,5 %.

**Gatos:** A CAM do isoflurano no gato é aproximadamente de 1,2 %.  
**Indução:** É possível efetuar a indução por máscara facial utilizando isoflurano de 5 %, com ou sem pré-medicação. Manutenção: A anestesia pode ser mantida utilizando o isoflurano em concentrações de 1,5 % a 2,5 %.  
Para Cães e Gatos

**Xilazin Cães** – IM e IV: 1,0-4,0 mg/kg  
**Gatos** – IM: 1,0-4,0 mg/kg  
IV: 1,0-3,0 mg/kg  
Para Cães e Gatos

## Anti-inflamatório

**Farmadex USO PARENTERAL**  
**Injetável:** Cães: 0,5 - 2mg de Dexametasona.  
Gatos: 0,25 - 0,5mg de Dexametasona  
**USO INTRA ARTICULAR**  
Pequenos Animais: 0,25 - 5mg.  
Para cães e gatos.

## Pomada Cicatrizante

**Cikado!** Aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área lesionada a cada 24 ou 12 horas, até completa cicatrização.  
Para Cães e Gatos

## Dermatológico

**Micodine** Agitar antes de usar. Uso tópico. Com os pelos úmidos, aplicar Micodine por todo o corpo do animal. Massagear suavemente até formar espuma. Deixar agir de 3 a 5 minutos e enxaguar. A frequência e o tempo do tratamento variam de acordo com o critério do médico veterinário.  
Para Cães e Gatos

